

BAROTRAUMATISMES.

LOI MISE EN CAUSE : BOYLE - MARIOTTE.

CAUSES	SYMPTOMES	C.A.T	PREVENTION	
PLAQUAGE DE MASQUE	Effet ventouse du à une dépression dans le masque.	Écoulement de sang par le nez. Hémorragie sous conjonctivale. Trouble de la vision.	Visite chez un O.R.L	Souffler de l'air par le nez dans le masque à la descente.
DES OREILLES	Déformation du tympan par dépression dans l'Oreille moyenne. Risque de rupture du tympan.	Douleurs importantes.	Remonter de quelques mètres. Visite chez un O.R.L	Ne pas forcer. Compenser. Pas de rhume. Ecarter la cagoule.
SINUS	<u>A la descente</u> , dépression du sinus. <u>A la montée</u> , surpression. Mauvaise circulation de l'air.	Dans l'eau : douleur violente. Après la plongée : Écoulement de sang par le nez.	<u>A la descente</u> : remonter, se moucher. <u>A la montée</u> : redescendre, se moucher.	Ne pas plonger si : Congestion(rhume) ou irritation. Polypes ou kystes. Utilisation de vasoconstricteurs.
DENTS	<u>A la descente</u> , cavité dentaire en dépression. <u>A la montée</u> , cavité dentaire en surpression.	Douleur parfois syncopale.	Se rendre chez un dentiste.	Visite régulière chez le dentiste.
GASTRIQUES	Air avalé en plongée. Eau avalée, détendeur défectueux. Boissons gazeuses avant la plongée Fermentation digestive.	Douleur abdominale.	Remonter doucement. Evacuer l'excès de gaz.	Alimentation adaptée. Matériel en bon état.
SURPRESSION PULMONAIRE	Lors d'une remontée trop rapide et d'un blocage de l'expiration. Spasme de la glotte. Panne d'air ou de détendeur. Exercice de remontée en expiration. Suite à une remontée rapide due à un essoufflement.	Douleur thoracique. Toux, mousse tachée de sang. Cyanose. Air sous la peau du cou (emphysème). Sensation de suffoquer. ----- Diverses paralysies. Cécité, trouble de la parole. Céphalées, convulsions, coma, confusion, désorientation. Arrêt : cœur, poumons.	Oxygène. Position de confort si conscient. Se conformer aux consignes du directeur de plongée. Ne pas gêner.	Ne pas bloquer sa respiration. Ne pas paniquer.